

血小板免疫学实验室血液样本采集要求

检验项目	样本类别	样本数量及容量	采样时间
血小板配型和交叉配血	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 EDTA 抗凝血 3ml，不抗凝血 3ml。	送检前 8 小时内
血小板同种抗体检测 (血小板输注无效)	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 EDTA 抗凝血 3ml，不抗凝血 3ml。	送检前 8 小时内
血小板同种抗体检测 (新生儿同种免疫血小板减少症)	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 父母亲 EDTA 抗凝全血各 10-15ml，婴儿 EDTA 抗凝全血 3ml，血样抽取后常温保存。	送检前 8 小时内
各类血小板膜糖蛋白 缺损或变异的检测和 鉴定	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 EDTA 抗凝全血 10-15ml，血样抽取后常温保存。	送检前 8 小时内
药物依赖性血小板抗体检测	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 EDTA 抗凝血 3ml，不抗凝血 3ml。 所使用的药物。	送检前 8 小时内
血小板特异性抗原的 血清学和基因分型鉴定	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 EDTA 抗凝血 10ml。	送检前 8 小时内
其他检测	全血	样管要求：玻璃或塑料试管。 EDTA 抗凝血 5ml。	送检前 8 小时内